

## Danskernes alkoholvaner – hvor stort er problemet?

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale  
i tidlig opsporende samtale.

Ulrik Becker  
København 010414

[ulbe@si-folkesundhed.dk](mailto:ulbe@si-folkesundhed.dk)


## Alkohol-kemi

- **Kalorisk værdi 7 kcal/g**
- **Absorberes hurtigt**
- **Fordeles i vandfasen  
(70 kg: mand – 45 l; kvinde 32 l)**
- **Omsætning**
  - ~7 g alkohol/time – i leveren  
(0,09 g alkohol per time per kg legemsvægt)
  - ~2% udskilles i udåndingsluft
  - < 5% udskilles i urin
- **Molekylevægt 46 g/mol**
- **Vægtfylde 0,789 g/ml**


**1 dansk genstand = 12 g alkohol**

- |                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| • 1 almindelig øl  | = | 1 genstand    |
| • 1 hvidtøl        | = | 0,4 genstand  |
| • 1 lys pilsner    | = | 0,6 genstand  |
| • 1 eksport-øl     | = | 1,3 genstande |
| • 1 porter         | = | 1,7 genstande |
| • 1 flaske vin     | = | 6 genstande   |
| • 1 flaske portvin | = | 10 genstande  |
| • 1 flaske whisky  | = | 20 genstande  |

**Cirka antal genstand = (antal cl × alkohol%) / 150.**



[www.dst.dk](http://www.dst.dk)



Kilde: Danmarks Statistik

STATENS INSTITUT  
FOR FOLKESUNDHED  
SYDDANSK UNIVERSITET

Per måned

REGION Hvidovre Hospital





eller



eller



Unge og gamle !!



## Hvornår har man et alkoholproblem ?

- Når man drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler?
- Når man har fået skrumpelever?
- Når man har fået snuppet kørekortet?
- Når man drikker mere end sin læge?
- Når nogen bliver kede af det?
  - Ægtefælle
  - Arbejdskamerater
  - Børnene

## Storforbrug

- ????????????????
- Ingen konsensus
  - > Sundhedsstyrelsens genstandsgrenser
  - Ikke skadeligt
  - Ikke afhængighed

## Skadeligt forbrug ICD-10



Hvidovre  
Hospital

- **Fysisk og psykisk skade  
(herunder skadet dømmekraft og adfærd)**
- **Skaden klart påviselig.**
- **Varighed mindst 1 måned eller gentagne  
gange indenfor 1 år.**
- **Ikke afhængig**

## Afhængighed definition ICD-10



Hvidovre  
Hospital

**3 af 6 symptomer sammenhængende i mindst én måned eller  
gentagne gange indenfor de seneste 12 måneder**

- Trang til stoffet ("craving")
- Svækket evne til at kontrollere indtagelsen, standse eller nedsætte forbruget
- Abstinenssymptomer ved ophør/reduktion eller indtagelse for at undgå symptomer
- Toleransudvikling
- Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
- Fortsat forbrug mod bedre vidende

**3 af 6 symptomer sammenhængende i mindst én måned eller  
gentagne gange indenfor de seneste 12 måneder**

- Trang til stoffet ("craving")
- Svækket evne til at kontrollere indtagelsen, standse eller nedsætte forbruget
- Abstinenssymptomer ved ophør/reduktion eller indtagelse for at undgå symptomer
- Toleransudvikling
- Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
- Fortsat forbrug mod bedre vidende

- **Storforbrug**
  - > genstandsgrænser
- **Skadeligt forbrug**
  - ICD-10
- **Afhængighed**
  - ICD-10



Kontinuum

Stigende sværhedsgrad

## DSM-V Substance Use Disorder



Hvidovre  
Hospital

	DSM-IV Abuse <sup>a</sup>		DSM-IV Dependence <sup>b</sup>		DSM-5 Substance Use Disorders <sup>c</sup>	
Hazardous use	X		–		X	
Social/interpersonal problems related to use	X	≥1 criterion	–		X	
Neglected major roles to use	X		–		X	
Legal problems	X		–		–	
Withdrawal <sup>d</sup>	–		X		X	
Tolerance	–		X		X	
Used larger amounts/longer	–		X		X	
Repeated attempts to quit/control use	–		X		X	
Much time spent using	–		X		X	
Physical/psychological problems related to use	–		X		X	
Activities given up to use	–		X		X	
Craving	–		–		X	

Let: 2-3 kriterier; middel: 4-5 kriterier; svær: 6-11 kriterier  
Tidlig remission: >= 3 md - <12 md; langvarig remission: >= 12 md

Am J Psychiatry. 2013;170(8):834-851. doi:10.1176/appi.ajp.2013.12060782

## NESARC N=43.093



Hvidovre  
Hospital

	Forekomst sidste 12 måneder		Forekomst hele livet	
	Alkohol- misbrug	Alkohol- afhængighed	Alkohol- misbrug	Alkohol- afhængighed
Total	4,7%	3,8%	17,8%	12,5%

Hasin DS et al. Arch Gen Psychiatry 2007; 64: 830-42


- **Definition uafhængig af ”stoffet”**
- **Har ikke noget med kvantum at gøre !**
- **Ikke livslang diagnose !**

**Storforbrug**  
860.000  
20% af 16+ årige


**Skadeligt forbrug**  
585.000  
13% af 16+ årige



**Afhængige**  
140.000  
3% af 16+ årige


**10-12.000 i behandling/år**




[http://www.danskernessundhed.dk/  
alkoholforbrug/](http://www.danskernessundhed.dk/alkoholforbrug/)












Juel K og Davidsen M. Risikoudviklingen I Danmark fremskrevet til 2020.  
Et arbejdsnotat. SIF 2009

- 20% af indlagte patienter (uafhængigt af speciale)
- 25-50% af skadestuepatienter
- Almen praksis: (Beich et al 2007)
  - 2% AUDIT > 21/>35 genstande/uge
  - 16% AUDIT ≥ 8
- Bredt udsnit af befolkningen
- De færreste er kendt af socialforvaltningen
- Socialt utsatte udgør en mindre del
  - < 15.000 (CRF/SIF)
  - 5.250 hjemløse i DK – 45% alkoholmisbrug (SFI 2007)
  - 31% af socialt utsatte havde dagligt alkoholforbrug (SUSY utsatte, SIF 2007)



■ 1997 ■ 1998 ■ 1999 ■ 2000 ■ 2001 ■ 2002 ■ 2003 ■ 2004  
■ 2005 ■ 2006 ■ 2008



Sundhedsstyrelsen

## Unge og alkohol

- Drikker fordi de bliver i bedre humør
- Stigende problemer med fokusering med stigende promille
- Det er rusen der tæller
  - Drikke sig i hegnet
  - Drikke for at brække sig
  - Hvis ikke bliver man nemt marginaliseret.
- Andelen af unge der drikker er faldende
- Stadig blandt de førende i Europa
- Det er forældrenes problem
  - Information og undervisning i skolen dur ikke
  - Forældreaftaler dur !
  - 9. klasse med – eller kan det være lige meget !!